

# Mesure de la pression du canal anal chez l'enfant (manométrie anorectale)

---

## À quoi sert cette intervention?

- Cette intervention sert à mesurer la force des muscles du sphincter anal de votre enfant.
- Les jeunes enfants qui nécessitent un sédatif avant l'intervention seront mis sous sédation sous la supervision d'un médecin du Centre de soins externes pour enfants (CSEE). L'intervention se déroulera ensuite au CSEE.
- Si votre enfant ne nécessite pas de sédation, l'intervention se déroulera à l'Unité d'exploration gastro-intestinale (GI).

## Qu'est-ce qui se passe durant l'intervention?

- Votre enfant sera dévêtu à partir de la taille et sera étendu sur une civière, sur le côté gauche.
- Le médecin insérera dans le rectum de votre enfant, sur une courte distance, un petit tube dont l'extrémité est munie d'un petit ballon lubrifié.
- On injectera de petites quantités d'air dans le ballon pour voir la façon dont les muscles anaux réagissent. Votre enfant pourrait ressentir une légère pression.
- Le test dure environ 30 minutes.

## Effets secondaires possibles

Il ne devrait y avoir aucun effet secondaire ni aucune complication.

## Après l'intervention

Vous devriez appeler le cabinet du médecin de votre enfant afin de fixer la date d'un rendez-vous de suivi pour discuter des résultats du test.

## Où dois-je aller pour cette intervention?

Si votre enfant nécessite une sédation avant l'intervention, celle-ci se déroulera au Centre de soins externes pour enfants (CSEE). Sinon, elle sera réalisée à l'Unité d'exploration gastro-intestinale (GI), au 4<sup>e</sup> étage, dans la pièce 473 de l'Hôpital Hôtel Dieu. Présentez-vous à l'Inscription, Jeanne Mance 4.

Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez l'Unité d'exploration gastro-intestinale (GI) au 613 544-3400, poste 2417,

- le lundi et le vendredi, entre 8 h et 12 h,
- et le mardi, le mercredi et le jeudi, entre 8 h et 14 h.