


## Surveillance ambulatoire du pH pendant 24 heures – pédiatrie

### À quoi sert cette intervention?

Cette intervention permettra au médecin de déterminer si votre enfant a un reflux gastrique dans l'œsophage et la gorge.

### Qu'est-ce qui se passe durant l'intervention?

- Votre enfant ne sera **pas** sous sédation pour cette intervention.
- On insérera un petit tube dans le nez de votre enfant jusque dans l'œsophage et on gardera le tube en place à l'aide d'un ruban.
- Le tube sera branché à un moniteur que votre enfant portera pendant 24 heures. Ce moniteur est facile à utiliser.
- On vous montrera et on montrera à votre enfant à remplir un journal des événements qui se produisent.



### Avant l'intervention

- La durée du jeûne peut aller de 4 heures à 8 heures selon l'âge de votre enfant. On vous indiquera la durée nécessaire avant le rendez-vous.
- Si votre enfant prend actuellement les médicaments ci-dessous, consultez le tableau qui suit.

Médicament	Quand arrêter	Continuer
	_____ jours avant le test	
	_____ heures avant le test	
	_____ heures avant le test	
	_____ heures avant le test	

### Le jour de l'intervention

- Pour assurer le confort de votre enfant, faites-lui porter des vêtements qui se ferment à l'avant.
- Présentez-vous à l'Inscription, Jeanne Mance 4, de l'Hôpital Hôtel-Dieu. Apportez la **carte Santé** de votre enfant.

## Après avoir quitté l'hôpital

- Évitez de mouiller le moniteur – pas de douche ni de bain.
- Ne donnez pas à votre enfant de fruits acides, de jus, de cornichons, ni de boissons gazeuses pendant la période de surveillance.
- Le lendemain matin, vous retournerez à la pièce 473 de l'aile Johnson de l'Hôpital Hôtel Dieu pour qu'on retire le tube et qu'on examine votre journal.

## Après l'intervention


Les résultats seront envoyés au médecin qui a demandé l'intervention. Veuillez faire un suivi avec lui pour obtenir les résultats.

## Effets secondaires possibles

- Le lubrifiant utilisé pourrait causer une légère sensation de brûlure sur la paroi nasale de votre enfant. Après qu'on aura retiré le tube, il pourrait y avoir une irritation du nez et un léger saignement, ce qui disparaîtra rapidement.
- Votre enfant pourrait avoir des haut-le-cœur pendant le passage du tube.
- Une fois que le tube est en place, les épisodes mineurs de toux ou d'éternuements ou le besoin de se moucher ne devraient pas causer de problèmes.

## Où dois-je aller pour cette intervention?

Empruntez l'entrée principale de l'Hôpital Hôtel-Dieu, rue Brock. Prenez l'ascenseur principal jusqu'au 4<sup>e</sup> étage. Suivez les enseignes menant à l'aire de réception du service, Jeanne Mance 4.



Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez l'Unité d'exploration gastro-intestinale au 613 544-3400, poste 2417,

- le lundi et le vendredi, entre 8 h et 12 h,
- et le mardi, le mercredi et le jeudi, entre 8 h et 14 h.